



## 572 - ODOR EM FERIDA NEOPLÁSICA MALIGNA: ABORDAGEM, CONDUTAS E CUIDADO DO ENFERMEIRO

**Tipo:** POSTER

**Autores:** NATÁLIA PEREIRA PINTO STEIN (UERJ), SABRINA NOGUEIRA DE CARVALHO (UERJ), DANIEL DA SILVA GRANADEIRO (UERJ), LÍVIA MÁRCIA VIDAL PIRES (INCA), JULIANA MENDONÇA MENDES (UERJ), ROSANGELA DE SOUZA MONTEIRO DE JESUS (UERJ), THAYANE MARRON DE CASTRO (UERJ)

**Introdução:** O câncer é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, o diagnóstico tardio da doença impacta na chance de remissão e sobrevida, e ocasiona maior chance de desenvolvimento da Ferida Neoplásica Maligna (FNM), podendo ocasionar alguns sinais e sintomas, como o odor. **Objetivo:** Analisar a produção do conhecimento das condutas realizadas pelo enfermeiro no cuidado da ferida neoplásica maligna apresentando odor. **Desenvolvimento:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. As buscas foram realizadas nas bases de dados da PUBMED, SCOPUS, CINAHL e LILACS. Foram incluídos artigos originais, disponibilizados na íntegra e que respondiam à pergunta da pesquisa; sem restrição de idiomas, com recorte temporal de 2018 a 2023, foram excluídos artigos de revisão, reflexões, teses, resumos, dissertações, monografias, carta de editor, capítulos de livros e ebooks. A pré seleção identificou 220 artigos, após a aplicação do processo de exclusão, foram identificados 18 artigos, realizado a leitura na íntegra e avaliação, obtendo a amostra final de 9 artigos. O odor é considerado um dos sintomas mais angustiantes em pessoas com FNM, podendo levar ao isolamento social. Geralmente, este sintoma está associado à presença de bactérias aeróbias e anaeróbias decorrentes do tecido desvitalizado encontrado no leito da ferida. O tratamento tópico mais citado nos artigos foi o metronidazol a 0,75% ou 0,8%, tendo um efeito nas primeiras 24 horas e podendo ser mantido por duas semanas.

Outro tipo de agente antimicrobiano utilizado no tratamento de feridas contra bactérias gram positivas e negativas é o Polihexametil Biguanina (PHMB). Uma das vantagens do PHMB em relação ao metronidazol é que o primeiro não desenvolve resistência bacteriana à longo prazo. Outros produtos também são mencionados no controle do odor, como o carvão ativado e curativos contendo prata. Em caso de presença de necrose torna-se necessário o desbridamento do leito da ferida, de forma cuidadosa, principalmente na presença de dor. **Considerações finais e Contrinuições para a Estomaterapia:** Considerando que o odor é um dos sintomas mais evidenciados em pessoas em FNM, causando isolamento social e diminuição da qualidade de vida, cabe ao enfermeiro realizar uma assistência segura e de qualidade, com o objetivo de reduzir e controlar esse sintoma. Além disso, o estomaterapeuta é o profissional mais capacitado para traçar as condutas e prestar assistência à pessoas com lesões na pele, sendo ainda responsável por colocar em prática a educação em saúde e disseminar as condutas ideais para esse tipo de cuidado.