

Tipo: POSTER

Autores: SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI), YARLA BRENA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA), ANTONIO GILBERTO ALBUQUERQUE BRITO (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA), ANA PAULA BEZERRA PITTA DO CARMO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ), ALINE COSTA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ), JEFFERSON ABRAÃO CETANO LIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Resumo

INTRODUÇÃO: Estoma é uma palavra de origem grega que significa abertura e refere-se à exteriorização de uma víscera oca com o meio externo, mediante intervenções cirúrgicas. As estomias de eliminação intestinal quanto ao segmento intestinal podem ser poder ser colostomias ou ileostomias e são classificadas em temporárias e permanentes. **OBJETIVO:** Caracterizar o perfil de pessoas com estomia de eliminação intestinal e determinar o custo da distribuição de equipamento. **MÉTODO:** Pesquisa documental realizado no serviço público de referência do Piauí. A coleta de dados foi realizada nos meses de abril a junho de 2021, por meio de revisão de 1364 prontuários dos pacientes com estomia de eliminação intestinal e digitadas em planilha do Excel. Os critérios de inclusão foram todos os pacientes cadastrados e excluídos os inativos. A análise dos dados será a partir da estatística descritiva. Para o cálculo do custo, foi utilizada a ata de registro de preço que tem variação no valor de equipamento de R\$ 8,39 a R\$ 21,75 e, na impossibilidade de valor exato de cada distribuição, foi utilizada a soma do valor da bolsa e adjuvantes pela quantidade adquirida e obtido preço médio de R\$10,20, que serviu como base de cálculo para os resultados. Esse estudo foi aprovado pelo CEP UESPI sob Parecer No. 059.410 **RESULTADO:** Dos 1364 prontuários avaliados, houve predomínio do sexo masculino (53,4%), média de idade de 55 anos, residentes em Teresina (51%) e estado do Maranhão (4%). A principal causa de confecção do estoma foram as neoplasias (46,7,%), seguido de outras causas como diverticulite, traumas, lesão por pressão, gangrena de Fournier (39,9%) e não identificados (13,4%). Quanto ao tipo de estomias predominou as colostomias (68,19%), Ileostomias (21,8%) e Urostomias (7,4%) As estomias temporárias foram prevalentes (52,9%) apresentando intervalo temporal de confecção do estoma entre um mês e mais de 20 anos, com tempo médio de dois anos. O custo médio mensal de equipamentos de estomias temporários foi de R\$ 79.788,50 e anual de R\$ 957.462,00 sendo que às permanentes tiveram custo médio mensal de R\$ 72.527,50 e anual R\$ 870.330,00 A estimativa de custo médio anual com as pessoas com estomias temporárias e definitivas foi de R\$1.827.792,00 **CONCLUSÃO:** Houve predomínio de homens, em idade produtiva com estomias temporárias, que apresenta custo médio superior as pessoas com estomias permanentes. Embora a média de tempo do estoma temporário seja de dois anos, foi elevado o quantitativo de pessoas com tempo prolongado, o que poderá dificultar a reconstrução de trânsito intestinal. Outro fato é o quantitativo de pessoas de cidades distantes da capital, inclusive de outros estados, reforçando a necessidade de políticas públicas para avaliação e dispensa do equipamento mais próximo ao local de residência. Por ser estudo documental, alguns registros estavam incompletos e recomenda-se recadastramento dos pacientes para avaliação das estomias temporárias, verificando interesse e condições clínicas para planejamento da reconstrução do trânsito intestinal, o que possibilitará melhora na qualidade de vida e redução de custos com equipamentos em pessoas que não precisam permanecer com a estomia de eliminação intestinal.

Referências: BAVARESCO, Marina. Complicações na estomia intestinal de eliminação e pele periestomia: processo de (in) adaptação à luz de Roy. 131.224.39, 2020 BRITO, Daniele; MAURO, Santos; VALERIA, Norma; et al. Perfil sociodemográfico de pacientes com estomia definitiva por câncer colorretal: interferência na qualidade de vida. Nursing (São Paulo), p. 3339–3344, 2019. Disponível em: . CARVALHO, Bruna Lima de; SILVA, Adriane do Nascimento Borges da; RIOS, Daiane Rodrigues Siqueira; et al. Assistência de enfermagem a pacientes com estoma intestinal. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 24, p. e 604, 2019.

Palavras-chaves: Estomaterapia. Enfermagem. Custo de Análise de Custo. Estomias.